

#### 8.5. Conclusions sur l'évolution du littoral de la CCT2C

- Les relevés réalisés en avril 2022 ont pu être comparés avec des données récentes datant de 2018, 2019, 2021 et 2020. Les résultats corroborent et confirment les tendances observées depuis plusieurs années.
- Globalement, la totalité du linéaire de la baie de Wissant a reculé depuis les derniers relevés (2019 et 2021) mais certains secteurs peuvent montrer une relative stabilité depuis 2021 comme le profil P460 au niveau de la dune d'Amont bien qu'il ait reculé de -6 m depuis 2020. Noter que ce profil se situe au-delà à proximité des casiers ;
- Un léger recul au niveau du profil situé à proximité des escaliers de la dune d'Aval soulignant l'effet positif des aménagements de protection mais le recul est de nouveau rapidement effectif vers l'ouest avec des valeurs comprises entre -1 m/an et -2 m/an. L'effort de confortement du pied de dune doit être soutenu d'autant plus que la largeur de plage est faible et que la couverture sédimentaire peu épaisse ;
- Un recul significatif au niveau de la dune du Châtelet où les casiers Tardinghais apparaissent peu efficaces puisque le TDC recule en arrière et provoque sans nul doute une accélération de l'érosion du haut de plage comme le montre le profil P550 ou les observations de terrain (Figure 16 et Figure 17);
- Au droit de la dune de la Baraque Fricot, la dune recule à un rythme élevé de -4 m/an à -2 m/an depuis 2019 laissant apparaître le substrat tourbeux en pied de dune sans pour autant limiter le recul du massif dunaire.